

Compte-rendu type d'Echoendoscopie rectale pour bilan d'endométriose :

Anesthésiste locale/générale:

Patiente en décubitus latéral gauche

Matériel : Echoendoscope radial Fujinon n°... avec/sans ballonnet, pinces et anses à usage unique.
Insufflateur CO2

Coloscopie courte:

Préparation par lavements Normacol et régime sans résidu de ... jours, de ... qualité (Boston)

Progression jusqu'à cm de la marge anale

Anomalie muqueuse:

* Absence d'anomalie muqueuse

* Infiltration muqueuse endométriosique visible à .. cm de la marge anale, au niveau rectal/de la charnière rectosigmoïdienne/sigmoïdien

* Compression extrinsèque : Pas de compression extrinsèque/ Compression extrinsèque sur % de la circonférence digestive

* Sténose digestive:Oui/Non, sur .. %, Franchissable/non franchissable

Échoendoscopie radiale menée jusqu'à 25-30 cm de la marge anale/ jusqu'à la charnière rectosigmoïdienne/ jusqu'au sigmoïde

- Nodule d'endométriose visualisé:

* Oui/non

* Taille en mm

* Infiltrant la paroi digestive: Oui/non

* Localisation de l'infiltration digestive :de .. à .. cm de la marge anale,

* Profondeur de l'infiltration : atteinte de la

- séreuse/musculeuse/sous-muqueuse/muqueuse

- Si atteinte de la musculeuse uniquement : dédoublant la musculeuse ou

non, et AVEC ou SANS franchissement de la circulaire interne

* Etendue de l'infiltration digestive : sur mm de largeur soit % de la circonférence digestive

- Cloison recto utérine normale:Oui/Non

- Cloison recto vaginale normale : Oui/Non

- Intégrité des plans sphinctérien interne et externe de l'anus:Oui/ Non (Si non, précision sur la localisation du défaut)

Conclusion : Endométriose pelvienne

- superficielle (Atteinte séreuse ou circulaire externe de la musculeuse)

- ou profonde (Atteinte circulaire interne de la musculeuse, sous-muqueuse ou

muqueuse)

par un nodule de .. mm du torus/ de la cloison rectovaginale/en regard de la

paroi sigmoïdienne

infiltrant la paroi digestive de façon transmurale (atteignant ou dépassant la

circulaire interne de la musculeuse) / superficielle (atteinte séreuse ou circulaire externe de la musculeuse, ou dédoublant nettement la musculeuse mais sans franchir la circulaire interne)

de ... à ... cm de la marge anale,

sur ... mm de largeur

soit ... % de la circonférence digestive.

Coloscopie courte : normale/ avec compression extrinsèque endométriosique sténosant (ou non) la lumière digestive, franchissable/non franchissable.

NB :
Fournir les images échographiques +/- endoscopiques